TINGIDES NOUVEAUX DU CONGO BELGE

PAR

le Dr H. SCHOUTEDEN
(Musée du Congo belge, Tervueren).

Il y a deux ans, j'ai donné dans cette Revue (vol. IV, pp. 288-297) l'énumération des Tingides connus du Congo belge. Cette liste comprenait 17 espèces, toutes représentées dans nos collections.

En étudiant des matériaux non encore classés lorsque je publiai ce travail, j'ai rencontré quatre espèces nouvelles à ajouter à ma liste de 1916, et dont trois nécessitent la création de genres nouveaux.

1. — **Kapiriella** n. gen.

Allongé, elliptique. Tête convexe, à peu près carrée, les yeux ne touchant pas le pronotum, dont ils sont séparés par une saillie plus ou moins nette qu'offre le cou de chaque côté (l'espace séparant l'œil du pronotum est plus long que l'œil lui-même); la tête offre une saillie conique en avant entre les antennes. Antennes grêles, sauf le premier article; troisième article très long; quatrième plus long que le premier qui lui-même est plus long que le deuxième. Pronotum à bords antérolatéraux finement laminés-relevés, notamment au niveau du col; angles latéraux arrondis, non proéminents; pas de vésicule; le processus aigu, long; une carène fort nette part du sommet de ce processus et se continue jusqu'au bord antérieur du pronotum;

latéralement le processus offre une carène un peu plus faible qui s'efface sur le disque du pronotum, lequel est assez fortement convexe entre les angles latéraux; processus un peu excavé entre les carènes. Élytres à aires nettes; membrane costale avec une seule série d'aréoles, assez grandes; les aires discale et latérale ponctuées-aréolées densément, de même que la base de la membrane; le reste de celle-ci à aréoles grandes; membrane costale peu angulée au niveau de l'apex de l'aire discale; sutures des aires discale et latérale peu mais nettement relevées sur le disque, au niveau de l'extrémité du processus du pronotum, de même que l'angle apical de l'aire discale. Pattes médiocres, les tibias postérieurs guère plus longs que les fémurs. Rostre caché à la base, les bucculae unis en avant, assez élevées. Mesosternum déprimé médianement, comme caréné latéralement.

Type du genre : *K. Leplaei* n. sp.

K. Leplaei n. sp.

D'un noir de poix, éclairci çà et là (notamment sur les côtés de la tête en arrière); les pattes et les antennes de même coloration, ainsi que les élytres (sauf exemplaires immatures), à l'exception de la partie distale et marginale qui est hyaline, le contour seul des aréoles étant sombre; le bord extrême distal en général plus clair. Extrémité des tibias plus ou moins éclaircie, brunâtre.

Long. : 2.25-2.75 mm.

J'ai sous les yeux plusieurs exemplaires de ce Tingide intéressant, récoltés à Kapiri par la Mission agricole de M. le professeur Leplae.

2. — **Wombalia** n. gen.

Allongé, étroit, rétréci vers l'arrière. Tête transversale, assez convexe, les yeux contigus au pronotum; entre les antennes deux petites épines dirigées en avant. Antennes grêles, surtout le troisième article; 1 subégal à 4 et plus long que 2, 3 le plus long de beaucoup. Pronotum à disque convexe, le processus en triangle aigu; angles latéraux non proéminents, arrondis; col net; bords latéraux carénés finement, plus nettement amincis au niveau du col; le col et le processus aréolés plus nettement, le disque ponctué fortement; une carène médiane nette sur le processus, moins marquée sur le disque, mais atteignant le col. Élytres allongés, aréolés nettement en entier;

marge costale formée d'une seule série d'aréoles; aire latérale en offrant deux, aire discale trois au niveau de l'apex du processus; membrane à aréoles grandes; les aires bien marquées. Pattes fines, les fémurs amincis à la base Bucculae fort élevées, soudées en avant, l'insertion du rostre cachée.

Type du genre : *W. Vanderysti* n. sp.

W. Vanderysti n. sp.

Noir, le disque du pronotum de chaque côté passant au brun de poix. Les parties suivantes blanches (blanc laiteux) : les tubercules à l'insertion des antennes, les épines céphaliques, le limbe antérieur (une rangée d'aréoles) du pronotum (revenant un peu en arrière sur la marge latérale), le processus presque en entier (sauf la marge latérale et la carène médiane), la base de l'élytre, les limbes antérieur du prostethium et postérieur du métastethium. Le reste de l'élytre subhyalin, les nervures d'un noir-brun sur la corie, le pourtour des aréoles de la membrane brun foncé également, brunâtre seulement sur la série externe. Les tibias d'un brun plus clair, l'extrémité éclaircie nettement, de même que le troisième article des antennes.

Long. : 2 mm. environ.

Je n'ai vu de ce joli Insecte qu'un seul exemplaire, récolté à Wombali par le R. P. Vanderijst, à qui je me permets de dédier ce type inédit.

3. — **Cysteochila Abettii** n. sp.

En dessus, d'un flavescent grisâtre, légèrement brunâtre, l'aire discale de la corie au milieu, un nuage voisin sur la marge costale, la membrane, sauf à la base et vers son extrémité, brunes.

Tête offrant quatre épines, trois partant de la base, obliques en avant et un peu convergentes, la quatrième antérieure et presque horizontale. Pronotum à côtés rabattus fortement sur le disque et s'étendant presque jusqu'à la ligne médiane, où ils sont séparés par la carène médiane, en lame fort élevée sur le disque, s'abaissant en avant et en arrière; ces parties rabattues offrent une sculpture aréolaire très fortement marquée, à aréoles grandes, et de plus sont relevées en bourrelet caréné longitudinalement près de leur marge interne (dont il est séparé par une seule série d'aréoles transversales) et, moins fortement, en dehors ; le disque déprimé longitudinalement donc entre ces deux bourrelets, de chaque côté ; sur le processus, une carène laté-

rale de chaque côté, ces deux carènes convergeant vers l'avant, où elles disparaissent sous les replis; le bord antérieur du pronotum formant une saillié conique au-dessus de la tête; pas de vésicule. Élytres arrondis largement au bout; marge costale avec deux séries d'aréoles, aire laterale de même, aire discale à six séries au niveau de l'apex du processus; aréoles de la marge grandes, les autres petites et serrées. Antennes (4 manque) et pattes testacées, les tibias plus flavescents, les tarses noirâtres au bout. Bucculae flavescent grisâtre, de même que le limbe antérieur du prostethium, le limbe postérieur des segments de la poitrine; le reste noirâtre ou brun foncé, à revêtement cendré.

Long. : 3.75 mm.

M. le Dr Abetti a recueilli un unique exemplaire de ce *Cysteochila*, à Kilo. Je me fais un plaisir de le lui dédier.

Le *C. Abettii* est assez aberrant par l'absence de vésicule au pronotum, mais je crois néanmoins pouvoir le placer dans le genre *Cysteochila*. Il rappelle aussi les *Bredenbachius*.

4. — **Lembella** n. gen.

Corps allongé, élargi en arrière au niveau du disque de la corie. Tête plus large que longue, les yeux non contigus au pronotum; très obtusément conique entre les antennes; pas d'épines. Antennes longues et grêles; le premier article plus long que le deuxième mais court, troisième très long, quatrième long et égalant la moitié du précédent. Pronotum à disque convexe assez fortement; processus triangulaire, à côtés bisinués; toute la surface ponctuée (et non aréolée), la ponctuation même presque effacée sur l'extrémité du processus; sur celui-ci trois carènes ne naissant que vers le milieu de la longueur, les deux latérales s'effaçant déjà sur le disque, la médiane s'atténuant très fortement mais atteignant le bord antérieur; le processus déprimé entre ces trois carènes; angles latéraux un peu proéminents mais arrondis; côtés à peu près droits, sans rebord aminci, sauf à l'angle latéral; col non marqué; cicatrices enfoncées. Élytres à aire discale et aire latérale fortement bombées en commun, la nervure qui les sépare reportée au sommet de cette convexité, en forme de carène; ces deux aires non (ou à peine perceptiblement) ponctuées, non aréolées non plus donc, lisses; la marge costale peu visiblement unisériée; membranes, par contre, à aréoles grandes et bien nettes. Orifices distincts, sillon nul. Bucculae contigus en avant. Pattes fines.

Type du genre : *L. Maynéi* n. sp.

L. Maynéi n. sp.

D'un noir de poix, à l'exception des $^3/_7$ apicaux environ de l'élytre, qui sont hyalins enfumés, le contour des aréoles brunâtre.

Long. : 2.75 mm.

Un unique exemplaire de ce Tingide, recueilli par M. R. Mayné à Congo da Lemba. Par le disque des élytres non ponctué ni aréolé, il est très caractéristique.

Ainsi que je l'ai rappelé plus haut, la liste des Tingides du Congo belge que j'ai publiée en 1916, comprenait 17 espèces. En réalité elle devait en comprendre 18, l'indication de l'*Habrochila placida* Horv., dont nous possédions également les types, ayant été omise.

Grâce aux additions que je puis actuellement faire à la faune des Tingides de notre Colonie, le chiffre des espèces connues est porté à 22, celui des genres à 14. Toutes ces espèces sont représentées dans nos collections. J'en donne ci-dessous l'énumération :

Genre **Piesma** Lep. et Serv.

1. — **Piesma marginepicta** Schout. (Typ.).

Genre **Phatnoma** Dist.

1. — **Phatnoma Maynéi** Schout. (Typ.).

Genre **Canthacader** Am. et Serv.

1. — **Canthacader tenuipes** var. **infuscata** Schout. (Typ.).

Genre **Serenthia** Spin.

1. — **Serenthia Maynéi** Schout. (Typ.).

Genre **Wombalia** Schout.

1. — **Wombalia Vanderysti** Schout. (Typ.).

Genre **Copium** Thunb.

1. — **Copium glabricorne** Mont.

2. — **C. stolidum** Horv. (Typ.).

Genre **Compseuta** Stal.

1. — **Compseuta ornatella** Stal.

Genre **Kapiriella** Schout.

1. — **Kapiriella Leplaei** Schout. (Typ.).

Genre **Phyllontocheila** Fieb.

1. — **Phyllontocheila Alberti** Schout. (Typ.).

2. — **Ph. Elisabethae** Schout. (Typ.).

3. — **Ph. laminata** Horv.

4. — **Ph. Laplumei** Schout. (Typ.).

5. — **Ph. Schoutedeni** Dist. (Typ.).

6. — **Ph. Waelbroecki** Schout. (Typ.).

Genre **Habrochila** Horv.

1. — **Habrochila placida** Horv. (Typ.).

Genre **Sankisia** Schout.

1. — **Sankisia pulchra** Schout. (Typ.).

Genre **Cochlochila** Stal.

1. — **Cochlochila Bequaerti** Schout. (Typ.).

Genre **Lembella** Schout.

1. — **Lembella Maynéi** Schout. (Typ.).

Genre **Cysteochila** Stal.

1. — **Cysteochila Abettii** Schout. (Typ.).

2. — **C. biseriata** Schout. (Typ.).

3. — **C. Maynéi** Schout. (Typ.).